

Hygiène bucco-dentaire

Les bons gestes dès le plus jeune âge

Dès l'apparition des premières dents, il est important de commencer le brossage. Vous pouvez retrouver tous les bons gestes à adopter dans la brochure : **Pas de carie, même sur mes dents de lait – ONE**



https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/brochures/pas-de-carie-acc.pdf



Suivi dentaire

Pour l'enfant porteur d'une cardiopathie, un suivi dentaire de 1 à 2 fois par an est recommandé, selon les conseils de votre dentiste.

Antibioprophylaxie avant les soins dentaires

Certains patients doivent prendre une prophylaxie antibiotique avant de se rendre chez le dentiste.

Qui est concerné ?

- Cardiopathies congénitales cyanogènes non corrigées
- Cardiopathies congénitales corrigées avec matériel prothétique :
 - Pendant les 6 premiers mois post-opératoires
 - A vie s'il persiste un shunt résiduel ou une fuite au contact du matériel
- Antécédent d'endocardite infectieuse

Penser à en informer son dentiste si le cardiopédiatre vous a indiqué que votre enfant nécessite une antibioprophylaxie.

Pour quels soins ?

Les soins dentaires à risque de bactériémie :

- Manipulation gingivale
- Manipulation de la région péri-apicale
- Perforation de la muqueuse orale

Comment ?

- Amoxicilline 50mg/kg (max 2000mg) 30-60min avant le geste
- Ou Clindamycine 15-20 mg/kg (max 600mg) 30-60min avant le geste en cas d'allergie à la pénicilline

Avant toute chirurgie cardiaque programmée, il est recommandé de consulter son dentiste afin de vérifier l'absence de foyer infectieux buccodentaire.

CAS POUR LESQUELS LA PROPHYLAXIE PAR ANTIBIOTIQUES EST NON RECOMMANDÉE

- radiographies dentaires, injections d'anesthésiques de routine dans un tissu non infecté, perte de dents de lait, pose de plaquettes orthodontiques, saignement dû à un traumatisme des lèvres ou de la muqueuse buccale
- infection virale des voies respiratoires
- incision, drainage ou retrait de fils de suture dans un tissu non infecté
- cathétérisme cardiaque, échographie trans-oesophagienne
- procédures respiratoires (bronchoscopie, laryngoscopie...), gastro-intestinales (gastrosopie, colonoscopie...) ou urologique (cystoscopie...)

SAINT-LUC
UNIVERSITÉ DE BRUXELLES

SAINT-LUC
UNIVERSITÉ DE BRUXELLES

SAINT-LUC
UNIVERSITÉ DE BRUXELLES

INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
SERVICE DE CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE
CONTACT : +32 2 764 13 80

Éditeur responsable : Thomas De Ryck / Service de communication

Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 18 • 1200 Bruxelles
www.saintluc.be

© Cliniques universitaires Saint-Luc
Tous droits réservés. Toute réimpression est interdite.

Service de cardiologie pédiatrique

PRÉVENTION DE L'ENDOCARDITE

Votre enfant est porteur d'une cardiopathie congénitale.

Pour lui, les recommandations sont :

- ☐ la prophylaxie simple de l'endocardite
- ☐ la prophylaxie par antibiotiques

Nom de l'enfant : _____

Cardiopathie : _____

Cardiologue : _____

