

Vaccins

Les vaccins sont fortement conseillés chez les enfants cardiaques car ils sont plus sensibles aux infections.



Calendrier vaccinal

Les enfants cardiaques suivent le même calendrier vaccinal que les autres enfants.

Votre cardiopédiatre pourra vous confirmer si des vaccins supplémentaires sont recommandés selon la situation de votre enfant.

Toutefois, après une chirurgie à cœur ouvert, il est conseillé d'attendre 4 à 6 semaines avant de recevoir un vaccin.

CALENDRIER DE VACCINAT

2025-2026

	Nourrissons				Enfants et adolescents				Adultes	
	8 sem. 12 mois	12 sem. 16 mois	16 sem. 18 mois	18 mois	5-6 ans	7-8 ans	13-14 ans	15-16 ans	Femmes enceintes	Tous les 10 ans
Poliomyélite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diphthérie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tétanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coqueluche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haemophilus influenza de type b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hépatite B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rougeole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rubéole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oreillons	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Méningocoques ACWY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pneumocoques	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotavirus (vaccin oral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papillomavirus (HPV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grippe (Influenza)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Recommandé à tous et gratuit
✓ Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit
✓ Recommandé à tous, partiellement remboursé selon la mutuelle
✓ Vaccin combiné (une seule injection)

Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies
Virus respiratoire syncytial (RSV) : une immunisation de la femme enceinte ou de l'enfant peut être proposée pendant la grossesse, à la naissance ou pendant les premiers mois de vie

① Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningocoques ACWY).
② En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
③ Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).
④ À partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.
⑤ Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans. Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.

Pour plus d'infos : Consultez votre médecin traitant ou le site www.vaccination-info.be

ONE
Ministère de la Santé
et de la Famille

Fédération Belge
des Pédiatres

Virus de l'hiver

Beyfortus® (RSV) : depuis septembre 2024, une immunisation contre le virus respiratoire syncytial (RSV) est proposée à la femme enceinte ou durant les premiers mois de vie de l'enfant. Il ne s'agit pas d'un vaccin au sens strict, mais d'anticorps monoclonaux (immunisation passive). Le virus du RSV peut provoquer des bronchiolites sévères, particulièrement dangereuses chez les nourrissons cardiaques.

Vaccin antigrippal : fortement recommandé chaque année pour les enfants atteints de cardiopathie. La vaccination de l'entourage est également essentielle, en particulier lorsque l'enfant est en bas âge.

La vaccination de l'entourage

La protection de votre enfant passe aussi par la vaccination de toute la famille et des proches réguliers (grands-parents, assistante maternelle, fratrie...). En vaccinant l'entourage, on réduit le risque que l'enfant soit exposé à des infections. Les vaccins recommandés pour l'entourage sont notamment la coqueluche et la grippe.

